

**ГОСТ 30106—94**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

**ЧЕСНОК СЕМЕННОЙ  
СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА  
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Издание официальное**

**БЗ 6—93/431**

**ГОСТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

## Предисловие

**1 РАЗРАБОТАН** Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства овощных культур, Техническим комитетом № 124 «Семена и посадочный материал овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов»

**ВНЕСЕН** Госстандартом России

**2 ПРИНЯТ** Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации — протокол № 6—94 от 21.10.94

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Узбекистан Украина	Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Узгосстандарт Госстандарт Украины

**3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 30.01.1995 г. № 20 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30106—94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с датой введения с 1 января 1996 г.**

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© Издательство стандартов, 1995

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b> Область применения . . . . .	<b>1</b>
<b>2</b> Нормативные ссылки . . . . .	<b>1</b>
<b>3</b> Требования . . . . .	<b>2</b>
3.1 Характеристики . . . . .	2
3.2 Маркировка . . . . .	4
3.3 Упаковка . . . . .	5
<b>4</b> Правила приемки . . . . .	<b>5</b>
<b>5</b> Методы испытания . . . . .	<b>6</b>
<b>6</b> Транспортирование и хранение . . . . .	<b>8</b>
Приложение А Апробация сортовых посевов семенного чеснока . . . . .	10
Приложение Б Форма удостоверения . . . . .	10
Приложение В Форма результата анализа . . . . .	13

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****ЧЕСНОК СЕМЕННОЙ  
СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА****Общие технические условия**

Seed garlic.  
Varietal and seeding characteristics.  
General specifications

Дата введения 1996—01—01

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на чеснок семенной, предназначенный для посева (посадки).

Требования к продукции, направленные на обеспечение здоровья людей и охраны окружающей среды, изложены в 3.1.3.2.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10131—93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия

ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 17812—72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия

ГОСТ 19908—90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и пробки из прозрачного кварцевого стекла. Технические условия

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования

ГОСТ 29329—92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

ГОСТ 30090—93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

### 3 ТРЕБОВАНИЯ

#### 3.1 Характеристики

3.1.1 Для посева (посадки) должен использоваться семенной чеснок районированных и перспективных сортов, утвержденных в установленном порядке.

3.1.2 По сортовой чистоте семенной чеснок делят на три категории: I, II, III в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1.

Таблица 1 — Сортовая чистота семенного чеснока

Культура	Сортовая чистота, %, не менее по категориям			Примесь других сортов в посадочном материале III категории, %, не более
	I	II	III	
Семенной чеснок	99,00	98,00	96,00	4

3.1.3 По посевным качествам семенной чеснок делят на два класса: 1-й и 2-й в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.

Таблица 2 — Посевные качества семенного чеснока

Наименование показателя	Характеристика и норма по классам	
	1-й	2-й
1. Внешний вид	Луковицы чеснока цельные, незагрязненные, по форме и окраске <i>свойственные ботаническому сорту</i> , не поврежденные вредителями и болезнями; с сухими общими кроющими чешуями; с целым твердым донцем; с остатками корней или без них, с сухой тонкой шейкой (у нестрелкующихся форм длиной до 50 мм, у стрелкующихся — до 20 мм)	



Окончание таблицы 2

Наименование показателя	Характеристика и норма по классам	
	1-й	2-й
2. Чистота, %, не менее	93,5	91,0
3. Размер:		
а) луковиц чеснока, по наибольшему поперечному диаметру, мм, не менее:		
- для озимого чеснока:		
стрелкующихся форм	30,0	25,0
нестрелкующихся форм	25,0	30,0
- для ярового чеснока	30,0	25,0
б) однозубок (севка) чеснока, по наибольшему поперечному диаметру, мм	Более 12,0	10,0—12,0
в) воздушных луковичек (бульбочек) чеснока, по наибольшему поперечному диаметру, мм	5,1—8,0	4,0—5,0
4. Наличие луковиц, однозубок, воздушных луковичек чеснока размером менее установленного, % к массе основной культуры, не более	3,0	5,0
Б. Наличие отхода и примеси в осенне-зимний период, всего, % к массе, не более:		
- для озимых форм	6,5	9,0
- для яровых форм	2,5	4,0
в том числе:		
а) луковиц, зубков, однозубок и воздушных луковичек больных, высохших, поврежденных вредителями	0,5	1,0
б) зубков, однозубок и воздушных луковичек с механическими повреждениями, оголенных (для озимых форм)	4,0	5,0
в) луковиц, однозубок и воздушных луковичек проросших (для озимых форм)	1,0	2,0
г) зубков с механическими повреждениями (для яровых форм)	1,0	2,0
д) примеси (земля, чешуи и др.)		1,0
6. Наличие отхода и примеси в весенний период, всего, % к массе, не более	4,0	6,5
в том числе:		
а) луковиц и зубков больных, высохших, поврежденных вредителями	1,0	1,5
б) зубков с механическими повреждениями, оголенных	1,5	3,0
в) луковиц проросших	0,5	1,0
г) примеси (земля, чешуи и др.)		1,0

3.1.3.1 Наличие здоровых зубков, отпавших от общего донца, допускается в 1-м классе не более 2%; во 2-м — не более 3%. Непосредственно перед посадкой наличие здоровых зубков, отпавших от общего донца, не учитывают.

У луковиц семенного чеснока многочешуйных сортов допускается наличие треснувших и оторванных чешуй без обнажения зубков.

3.1.3.2 В семенном чесноке не допускается наличие живых клещей и стеблевой нематоды, а также подмороженных и запаренных луковиц и однозубок.

3.1.4 В зависимости от назначения семенной чеснок должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Качество семенного чеснока в зависимости от его назначения

Назначение семенного чеснока	Категория, не ниже	Класс, не ниже
Семенной чеснок суперэлиты и элиты, выращиваемый научно-исследовательскими учреждениями и учебно-опытными хозяйствами сельскохозяйственных вузов и высаживаемый в семеноводческих и других хозяйствах для размножения	I	1
Семенной чеснок первой и второй репродукций, высаживаемый в семеноводческих и других хозяйствах для размножения	II	1
Семенной чеснок первой и второй репродукций, высаживаемый в семеноводческих и других хозяйствах на площадях товарного назначения	III	2
<p>Примечание — Для местных сортов, по которым элита не выращивается, допускается посев (посадка) в семеноводческих хозяйствах семенным чесноком любой репродукции, но по сортовой чистоте не ниже норм II категории.</p>		

## 3.2 Маркировка

3.2.1 Каждую единицу упаковки с семенным чесноком маркируют по ГОСТ 14192. Маркировка наносится водонерастворимой краской по трафарету на тару или бирку с указанием:

- культуры;
- сорта;
- номера партии;
- наименования хозяйства, вырастившего чеснок, и его адреса;
- сортовой чистоты;

- репродукции, поколения;
- класса;
- обозначения настоящего стандарта.

### 3.3. Упаковка

3.3.1 Семенной чеснок затаривают в ящики по ГОСТ 17812, ГОСТ 10131.

3.3.2 Допускается транспортировать семенной чеснок в тканевых мешках по ГОСТ 30090.

3.3.3 Масса нетто единицы упаковки (ящики и мешки) не должна превышать 30 кг.

## 4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Семенной чеснок принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по происхождению и качеству семенного чеснока, сопровождаемое соответствующими документами.

4.2 Для контроля качества семенного чеснока на соответствие требованиям настоящего стандарта из партии неупакованного чеснока отбирают точечные пробы равномерно по всей насыпи закрома или стеллажа из разных мест и слоев (верхнего, среднего и нижнего); из партии упакованного чеснока выделяют выборку (ящики, мешки).

4.2.1 От партии неупакованного семенного чеснока массой до 6,0 т для луковиц, 1,5 т для однозубок и 0,1 т для воздушных луковичек точечные пробы отбирают в следующем количестве (от каждого закрома или стеллажа):

- при хранении в закромах — 30 проб;
- при хранении в специальных хранилищах на стеллажах — 10 проб.

4.2.1.1 При большей массе партии на каждые следующие полные или неполные 6,0 т луковиц, 1,5 т однозубок и 0,1 т воздушных луковичек дополнительно отбирают уменьшенное в два раза количество точечных проб.

4.2.2 От партии упакованного (ящики, мешки) семенного чеснока выделяют выборку в следующем количестве:

- до 5 упаковочных единиц — все упаковки;
- от 6 до 75 — каждую пятую, но не менее 5;
- от 76 и более — каждую двадцатую, но не менее 10.

4.2.2.1 Из каждого выделенного в выборку ящика или мешка отбирают точечные пробы в двух местах из разных слоев поочередно (сверху, в середине и снизу).



## 5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

### 5.1 Определение сортовых качеств

Сортовые качества семенного чеснока определяют путем полевой апробации, проводимой по документации, указанной в приложении А.

### 5.2 Определение посевных качеств

#### 5.2.1 Средства испытания

Весы с пределом взвешивания не более 10 кг и ценой проверочного деления не менее 5 г.

Весы для статического взвешивания по ГОСТ 29329.

Линейка измерительная по ГОСТ 427.

Штангенциркуль по ГОСТ 166.

Лупа, биноклярные очки.

Сито с диаметром отверстий 1 мм с поддоном.

Резиновая трубка.

Воронка и чашка стеклянные по ГОСТ 19908.

Сетка с размером ячеек 1—2 мм.

#### 5.2.2 Подготовка к испытанию

5.2.2.1 Точечные пробы, отобранные по 4.2.1 и 4.2.2.1, соединяют и составляют объединенную пробу массой не менее: 2 кг — для луковиц чеснока; 0,5 кг — для однозубок и 0,1 кг — для воздушных луковичек.

5.2.2.2 Если партия семенного чеснока больше, чем указано в 4.2.1, то на каждые следующие полные и неполные 6,0 т для луковиц, 1,5 т для однозубок и 0,1 т для воздушных луковичек массу объединенной пробы увеличивают соответственно на 1 кг, 0,25 кг и 0,05 кг.

#### 5.2.3 Проведение испытания

##### 5.2.3.1 Определение наличия клещей

Объединенную пробу чеснока сразу после поступления просеивают на сите с диаметром отверстий 1 мм. Отсев с поддона высыпают на стекло, под которое подложена черная бумага, и просматривают его под лупой или другим оптическим прибором на наличие клещей.

В холодный период года объединенную пробу чеснока выдерживают при комнатной температуре в течение 1,5—2 ч, а перед испытанием подогревают до 25—30°C для приведения клещей в подвижное состояние.

Кроме того, просматривают донца каждой луковицы.

##### 5.2.3.2 Определение внешнего вида

Объединенную пробу чеснока просматривают на соответствие луковиц характеристике пункта 1 таблицы 2.

### 5.2.3.3 *Определение чистоты*

Из объединенной пробы чеснока выделяют отход, примеси и луковицы основной культуры.

К отходу относят: луковицы, зубки, однозубки и воздушные луковички больные, поврежденные вредителями (в том числе проволочником и трипсом), высохшие, с механическими повреждениями, оголенные (имеют более  $\frac{1}{4}$  обнаженной поверхности), проросшие (образовавшие росток и начальные корни), дефектные зубки.

К примеси относят: землю, чешуи, металлические частицы и др.

5.2.3.3.1 Выделенные группы чеснока отхода, примеси и основной культуры взвешивают отдельно с точностью до 1 г.

### 5.2.3.4 *Определение размера*

Луковицы, однозубки и воздушные луковички основной культуры измеряют штангенциркулем или линейкой по наибольшему поперечному диаметру, выделяя при этом луковицы менее установленных размеров.

### 5.2.3.5 *Определение зараженности болезнями*

Больные и поврежденные болезнями (гниль донца, серая гниль, зеленая плесень и др.) луковицы, однозубки и воздушные луковички, выделенные при анализе на чистоту в отход, освобождают от наружных чешуй и каждый зубок разрезают на две и более части для проверки состояния внутренних тканей.

5.2.3.5.1 Зараженность семенного чеснока стеблевой нематодой определяют сначала по внешним признакам: поражена мясистая часть зубков (разрастание и утолщение), чешуя рубашки разрушена и дает трещины. Больные луковицы имеют рыхлое строение и издадут резкий, специфический запах.

5.2.3.5.2 Луковицы с неясно выраженными признаками повреждения стеблевой нематодой исследуют следующим способом (вороночный метод).

Укрепляют стеклянную воронку диаметром 120—150 мм на штативе, на конец воронки надевают резиновую трубку длиной 100 мм с зажимом на конце. В воронку вставляют сетку с диаметром ячеек 1—2 мм, на нее помещают кусочки зараженного чеснока, заливают водой, имеющей температуру 20—30°C, и оставляют на 1—2 ч.

Нематоды от воздействия теплой воды выходят из тканей зубков и попадают в нижнюю часть воронки. Затем открывают зажим на резиновой трубке, спускают часть воды в стеклянную чашку и просматривают ее под биноклем для обнаружения нематоды.

Нематоды имеют нитевидное тело, заметно суженное на концах, слегка притупленное спереди и заостренное на хвосте, по длине достигает 0,8—1,7 мм.

#### **5.2.4 Обработка результатов**

Количество чеснока основной культуры, отхода и примеси вычисляют в процентах к массе объединенной пробы.

Количество луковиц, однозубок и воздушных луковичек размером менее установленного стандартом, а также наличие отпавших зубков от общего донца вычисляют в процентах к массе основной культуры.

Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением до первого.

5.2.5 В случае разногласий проводят повторную проверку качества партии семенного чеснока в присутствии представителя госсеминаспекции.

Результаты этой проверки являются окончательными.

5.2.6 По окончании испытания качества семенного чеснока, в зависимости от полученных результатов, хозяйству (организации) — производителю выдают следующие документы:

«Удостоверение о кондиционности посадочного материала» по форме, изложенной в приложении Б, если семенной чеснок соответствует требованиям настоящего стандарта;

«Результат анализа посадочного материала» по форме, изложенной в приложении В, если семенной чеснок не соответствует требованиям настоящего стандарта.

### **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

#### **6.1 Транспортирование**

6.1.1 Транспортирование семенного чеснока осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок посадочного материала, действующими на данном виде транспорта.

6.1.2 Транспортирование семенного чеснока проводится в ящиках, сформированных в транспортные пакеты, средства скрепления в транспортных пакетах по ГОСТ 21650, с основными параметрами и размерами по ГОСТ 24597, с общими техническими требованиями формирования на поддонах по ГОСТ 26663.

Допускается по согласованию с получателем перевозить семенной чеснок в открытых автомашинах в мешках с защитой от воздействия атмосферных осадков, солнца брезентом, при температуре не ниже  $(1 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ .

#### **6.2 Хранение**

6.2.1 Чеснок на зимнее хранение закладывают в специальные хранилища или приспособленные помещения в ящиках, которые размещают штабелями высотой 2—3 м, на стеллажах слоем 30—40 см, или в закромах слоем 1,5 м.



6.2.2 Семенной чеснок следует хранить в условиях, обеспечивающих его максимальную сохранность.

Перед закладкой на хранение чеснок подвергают сушке в течение 10—12 дней при температуре 20—25°C, за 2—3 дня до окончания сушки температуру повышают до 35°C.

6.2.2.1 Семенной чеснок хранят тремя способами:

1) В хранилищах с искусственным охлаждением при температуре (минус 1 — минус 3)°C и относительной влажности воздуха 80—90%.

2) В теплых хранилищах — при температуре 16—20°C и относительной влажности воздуха 50—70%.

3) Хранение при температуре 18—20°C в течение пяти с половиной месяцев (начиная с октября) и при относительной влажности воздуха 65—70%, а затем с последующим охлаждением в течение полутора месяцев (начиная с середины марта) при температуре 2—5°C и относительной влажности воздуха 75—80%.



**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(справочное)

**АПРОБАЦИЯ СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ СЕМЕННОГО ЧЕСНОКА**

Апробацию сортовых посевов семенного чеснока проводят по «Инструкции по апробации посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты», утвержденной Минсельхозом 30 июня 1976 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(обязательное)

**ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ**

О КОНДИЦИОННОСТИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА № \_\_\_\_\_

Выдано \_\_\_\_\_  
наименование хозяйства, организации и местонахождение

на пробу посадочного материала \_\_\_\_\_  
культура, сорт

репродукции \_\_\_\_\_ категории \_\_\_\_\_ года урожая \_\_\_\_\_

от партии № \_\_\_\_\_ массой \_\_\_\_\_ т, полученного от \_\_\_\_\_

и представленного на анализ при акте № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.,

хранящегося \_\_\_\_\_  
№ бригады, отделение совхоза, заготорганизации

Число мест (насыпью) \_\_\_\_\_ хранилище № \_\_\_\_\_

закром № \_\_\_\_\_ тара \_\_\_\_\_  
мешки, ящики

Назначение посадочного материала \_\_\_\_\_

Качество посадочного материала соответствует классу \_\_\_\_\_  
подпись

## Результаты анализа

Внешний вид \_\_\_\_\_

Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру, мм

Озимый чеснок:

а) стрелкующиеся формы \_\_\_\_\_

б) нестрелкующиеся формы \_\_\_\_\_

Яровой чеснок \_\_\_\_\_

Размер однозубок (севка) чеснока по наибольшему поперечному

диаметру, мм \_\_\_\_\_

Размер воздушных луковичек (бульбочек) чеснока по наибольшему попереч-

ному диаметру, мм \_\_\_\_\_

Наличие луковиц, однозубок, воздушных луковичек размером менее установлен-

ных стандартом, % к массе \_\_\_\_\_

для озимых форм \_\_\_\_\_

для яровых форм \_\_\_\_\_

в том числе:

а) луковиц, зубков, однозубок и воздушных луковичек больных, высохших,

поврежденных вредителями \_\_\_\_\_

б) зубков, однозубок и воздушных луковичек с механическими поврежде-

ниями, оголенных (для озимых форм) \_\_\_\_\_

в) луковиц, однозубок и воздушных луковичек проросших (для озимых

форм) \_\_\_\_\_

г) зубков с механическими повреждениями (для яровых форм) \_\_\_\_\_

д) мертвого сора (земля, чешуи)

Содержание отхода и примеси в весенний период, всего, % к массе \_\_\_\_\_

в том числе:

а) луковиц и зубков больных, высохших, поврежденных

вредителями \_\_\_\_\_

б) зубков с механическими повреждениями, оголенных \_\_\_\_\_

в) луковиц проросших \_\_\_\_\_

г) мертвого сора (земли, чешуи) \_\_\_\_\_

Наличие здоровых зубков, отпавших от общего донца \_\_\_\_\_

Наличие живых клещей и стеблевой нематоды \_\_\_\_\_

Наличие подмороженных и запаренных луковиц и однозубок \_\_\_\_\_

М.П.

Начальник  
инспекции

Государственной семенной

\_\_\_\_\_   
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(обязательное)

## ФОРМА РЕЗУЛЬТАТА АНАЛИЗА

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА № \_\_\_\_\_

Выдан \_\_\_\_\_  
наименование хозяйства, организации и местонахождениена пробу посадочного материала \_\_\_\_\_  
культура, сорт

репродукции \_\_\_\_\_ категории \_\_\_\_\_ года урожая \_\_\_\_\_

от партии № \_\_\_\_\_ массой \_\_\_\_\_ т, полученного  
от \_\_\_\_\_и представленного на анализ при акте № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.,  
хранящегося \_\_\_\_\_

№ бригады, отделение совхоза, заготорганизация

Число мест (насыпью) \_\_\_\_\_ хранилище № \_\_\_\_\_

закром № \_\_\_\_\_ тара \_\_\_\_\_  
мешки, ящики

Назначение посадочного материала \_\_\_\_\_

## Результаты анализа

Внешний вид \_\_\_\_\_

Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру, мм

Озимый чеснок:

а) стрелкующиеся формы \_\_\_\_\_

б) нестрелкующиеся формы \_\_\_\_\_

Удобрения \_\_\_\_\_



**ГОСТ 30106—94**

Размер однозубок (севка) чеснока по наибольшему поперечному диаметру, мм \_\_\_\_\_

Наличие луковиц, однозубок, воздушных луковичек размером менее установленного стандартом, % к массе \_\_\_\_\_

Содержание отхода и примеси в осенне-зимний период, всего, % к массе:

для озимых форм \_\_\_\_\_

для яровых форм \_\_\_\_\_

в том числе:

а) луковиц, зубков, однозубок и воздушных луковичек больных, высохших, пораженных вредителями \_\_\_\_\_

б) зубков, однозубок и воздушных луковичек с механическими повреждениями, оголенных (для озимых форм)

в) луковиц, однозубок и воздушных луковичек проросших (для озимых форм) \_\_\_\_\_

г) мертвого сора (земля, чешуи) \_\_\_\_\_

Содержание отхода и примеси в весенний период, всего, % к массе \_\_\_\_\_

в том числе:

а) луковиц и зубков больных, высохших, поврежденных вредителями \_\_\_\_\_

б) зубков с механическими повреждениями, оголенных \_\_\_\_\_

в) луковиц проросших \_\_\_\_\_

г) мертвого сора (земля, чешуи) \_\_\_\_\_

Наличие здоровых зубков, отставших от общего донца \_\_\_\_\_

Наличие живых клещей, стеблевой нематоды \_\_\_\_\_

Наличие подмороженных и запаренных луковиц и однозубок \_\_\_\_\_

Заключение и предложения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

Начальник Государственной

семенной инспекции \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

**УДК 635.262 : 006.354      ОКС 65.020.20      С41      ОКП 97 3231**

**Ключевые слова:** чеснок семенной, луковицы, однозубки, воздушные луковички, качество, чистота, отход, примеси, засоренность, зараженность, вредители, болезни, клещ, нематода, размер

---

**Редактор Л. В. Афанасенко  
Технический редактор В. Н. Прусакова  
Корректор А. С. Черноусова**

**Сдано в набор 22.02.95.    Подп. в печать 05.04.95.    Усл. печ. л. 1,16.    Усл. кр.-отт. 1,16.  
Уч.-изд. л. 0,90. Тир. 824 экз. С 2285.**

---

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 460**